

Neochen jubata

Familia

Anatidae

Pato Carretero

El Pato Carretero se distribuye por el oriente de Suramérica desde Venezuela y las Guayanas hasta el norte de Argentina. En Colombia está al oriente de los Andes en la Orinoquia, aunque hay algunos registros en la Amazonía (Borrero 1972, Olivares 1982, Hilty y Brown 1986). A pesar de que esta distribución es amplia, es igualmente fragmentada y las poblaciones están confinadas a unas pocas localidades (Madge y Burn 1988). Los estimados de la población global de *N. jubata* varían entre 25,000 y 100,000 individuos, pero con mucha incertidumbre con respecto a que parte de este rango sea más aproximado a la realidad (Rose y Scott 1997). Los censos recientemente recolectados por K. Kriese (información no publicada) en diferentes localidades en Venezuela, indicarían que el tamaño total de la población podría estar cerca de 25,000 individuos. En algunas regiones de Colombia,

como en los ríos Duda y Guayabero, se ha reportado que este pato era abundante estacionalmente, pero casi ha desaparecido debido a la cacería. El Pato Carretero habita principalmente en humedales de sabana, en sitios adyacentes a ríos, lagunas y otros cuerpos de agua. Aparentemente realiza movimientos estacionales; anida en cavidades en árboles con bastante ramaje, los cuales pueden convertirse en un recurso limitante si son eliminados al transformarse el paisaje (K. Kriese com. pers.). Se requiere estudiar su ecología y dinámica poblacional, en particular en lo relacionado a las posibles migraciones regionales. La conservación de este pato depende de la protección de los humedales en una escala que tenga en cuenta los movimientos regionales. Esta especie se considera casi amenazada globalmente por los criterios A2,cd + 3c,d (BirdLife International 2000).

Accipiter collaris

Familia

Accipitridae

Azor Collarejo

Esta especie se distribuye desde el suroccidente de Venezuela hasta Perú, sobre ambos flancos de los Andes (Ellis y Álvarez 1994). En Colombia se encuentra en la vertiente Pacífica, en la cordillera Central, en la cordillera Oriental

y en la Sierra Nevada de Santa Marta (Hilty y Brown 1986). La especie es poco conocida en todo su rango (Hilty y Brown 1986). Se encuentra en bosques y bordes de bosque, principalmente subandino y de niebla o lluvioso, entre los 600

Accipiter collaris

y 1800 m (Hilty y Brown 1986). El pobre conocimiento sobre esta especie hace suponer que tiene requerimientos especiales de hábitat y forrajeo o que requiere grandes extensiones de territorio (Karr 1977). Se alimenta de pequeños pájaros, como lo indican Cuervo *et al.* (1999 a) que reportan como un individuo de esta especie les “robó” de las manos un pequeño hornero (*Phylidor rufus*) capturado en redes, en el borde de un claro al interior de un bosque. En varios estudios (1996-1998) en la región del volcán Cumbal algunos individuos y parejas fueron observados regularmente cazando en bordes de bosque y sobre filos (R. Strewe com. pers.). Incluye también en su dieta pequeños mamíferos y reptiles. Es posible que la fragmentación y destrucción del hábitat por deforestación sean las principales amenazas para esta especie. Existen varias áreas

protegidas en donde recientemente se ha reportado esta especie como el P.N.N. Munchique, la Reserva Natural Tambito en Cauca, la Reserva Natural La Planada en Nariño y la Reserva Regional La Forzosa (320 ha de bosque) en Antioquia (Negret 1991, 1994; Donegan y Dávalos 1999, Strewe com. pers., Cuervo *et al.* 1999 a). El P.N.N. Puracé podrían albergar poblaciones de esta especie, sin embargo esta situación debe ser confirmada. Este gavilán ha sido incluido en el apéndice II de CITES. Esta especie no se encuentra amenazada en Colombia y a nivel global se considera también como casi amenazada por que se estima que su población es pequeña y en disminución C1; C2a(i) (BirdLife International 2000). Se estima que ha perdido el 71% de su hábitat. Su extensión de presencia es de 501,520 km² y la extensión de su hábitat potencial es de 45,060 km².

Leucopternis plumbea

Familia

Accipitridae

Águila Pizarra

Esta especie se distribuye desde el occidente de Panamá hasta el extremo noroccidental de Perú. En Colombia se ha registrado en la costa del Pacífico y el extremo sur de la cordillera Occidental, especialmente en Nariño (Hilty y Brown 1986; Bierregaard 1998). Habita selvas y bosques húmedos en tierras bajas y piedemontes desde el nivel del mar hasta los 700-800 m (Hilty y Brown 1986,

Parker *et al.* 1996). Especie rara de estratos altos pero por su comportamiento de depredador pasivo podría pasar desapercibida (Salaman *in litt.* 1999, BirdLife International 2000). Su principal amenaza es la destrucción de hábitat. Incluida en el apéndice II de CITES y apéndice II de CMS. Esta especie puede sobrevivir a largo plazo si se reduce la ascendente tasa de deforestación